Plastic Surgery Institute

Guide du patient · Chirurgie cervicale

Lifting du cou

Un choix personnel. Comprendre l'anatomie, les options, la préparation, les suites et les limites.



02 Comprendre le lifting du cou
03 Consultation et préparation
04 Intervention et incisions
05 Récupération et résultats
06 Risques et sécurité
07 Coût et choix du chirurgien



Dr Imad Shehadi
Plastic Surgery Institute
63 rue Souraty, immeuble Hamra Nassif, 1er étage, Beyrouth, Liban
Téléphone +9611746345 · WhatsApp +9613307854
psi@psi-lb.com

01 · Les bases

Comprendre le lifting du cou

Le lifting du cou traite certains changements sous le menton, le long de la mâchoire et dans le cou. Graisse, peau et muscle platysma doivent être évalués séparément : ce ne sont pas les mêmes problèmes.



Schéma éducatif, non un plan opératoire individuel ni une prévision du résultat.

Trois éléments différents

La graisse sous le menton peut créer une plénitude. Les bandes platysmales sont des cordons verticaux liés au muscle fin situé sous la peau du cou. Une peau relâchée peut former des plis malgré peu de graisse. Plusieurs éléments peuvent coexister : enlever la graisse seule ne corrige pas de façon fiable les bandes musculaires ni un excès cutané important.

Améliorations possibles et limites

Selon l'intervention, la peau est redrapée, certaines graisses réduites et le platysma soutenu. Le lifting du cou ne relève pas automatiquement les joues et ne traite pas les paupières. Un lifting facial distinct ou associé peut être discuté pour les bajoues ; il n'est pas inclus par définition. Ridules, taches et asymétries naturelles peuvent persister.

Une option adaptée à votre situation ?

Des adultes de tout genre peuvent être candidats après évaluation médicale. Santé générale, qualité cutanée, nicotine et attentes réalistes comptent davantage qu'un âge précis. Variations de poids et vieillissement peuvent modifier le résultat. Une mâchoire parfaitement dessinée ou un bénéfice émotionnel particulier ne sont pas garantis.

Discuter aussi des alternatives

Ne rien faire reste un choix valable. La liposuccion seule peut convenir à certaines graisses localisées avec une peau élastique. Les traitements non chirurgicaux peuvent répondre à certaines préoccupations, sans reproduire l'excision cutanée et le soutien profond d'une opération.

02 · Avant l'intervention

Consultation et préparation

Une consultation utile part de vos préoccupations, pas d'une technique choisie à l'avance. Le chirurgien explique quels tissus contribuent à l'aspect du cou et quelles modifications sont réalistes.

Préparer vos antécédents

- Décrivez objectifs, opérations du visage ou du cou, injections, cicatrices et difficultés de cicatrisation.
- Signalez allergies, maladies, médicaments, vitamines, plantes, compléments, alcool, tabac et nicotine.
- Mentionnez problèmes de saignement, thrombose, tension artérielle ou anesthésie, et tout symptôme nécessitant un bilan.

Ce que l'examen doit préciser

Le chirurgien évalue élasticité et excès de peau, graisse sous le menton et ailleurs dans le cou, bandes platysmales, soutien mandibulaire et différences entre côtés. Examen, mesures et photographies documentent la situation initiale. Demandez ce qui peut changer et quelles limites impose votre anatomie.

Se préparer avec l'équipe

Un bilan médical ou des examens peuvent être nécessaires. Demandez un programme individuel d'arrêt de la nicotine et une révision des médicaments influençant saignement ou cicatrisation. N'arrêtez jamais un traitement prescrit, notamment un anticoagulant, sans accord du prescripteur. Ce guide ne donne ni dose ni calendrier universel d'arrêt.

Organiser une aide concrète

Confirmez jeûne, toilette et arrivée. Prévoyez transport aller-retour et présence d'un adulte la première nuit, puis davantage si nécessaire. Demandez si une surveillance nocturne est possible et qui répond hors des horaires habituels.

Avant de consentir

Faites expliquer les incisions prévues, l'éventuel accès sous le menton, les gestes associés, l'anesthésie et les restrictions. Gardez du temps pour vos questions et une décision sans pression. Vérifiez comment joindre l'équipe en urgence avant de quitter la consultation.

03 · Le jour de l'intervention

Intervention et incisions

Il n'existe pas une seule opération de lifting du cou. Les voies d'accès dépendent de l'excès cutané, de la graisse, des bandes musculaires et d'un éventuel traitement du bas du visage.

Anesthésie et surveillance

Une anesthésie générale ou une sédation avec anesthésie locale peut être adaptée selon votre santé et l'étendue du geste. L'équipe explique sa recommandation et assure la surveillance pendant l'opération. La sortie le jour même n'est pas garantie.




Schéma éducatif, non un plan opératoire individuel ni une prévision du résultat.

Des accès adaptés aux tissus

Les incisions peuvent contourner les oreilles et se prolonger dans la ligne des cheveux derrière elles ; leur départ et leur longueur varient. Une petite incision distincte sous le menton peut être nécessaire pour certains gestes graisseux ou musculaires. Un accès limité autour des oreilles convient à certains cas, mais peut limiter la correction.

Graisse, muscle et peau : des gestes sélectifs

Le chirurgien peut remodeler certaines graisses, repositionner les tissus de soutien et retendre le platysma lorsque cela est indiqué. Tous les cous ne nécessitent pas de geste musculaire ou de liposuccion. La peau est redrapée et son excès retiré. Ces décisions suivent l'examen médical ; ce ne sont pas des gestes à reproduire hors du bloc opératoire.

Fermeture et compromis cicatriciel

Les incisions sont fermées par des fils, parfois avec de la colle cutanée. Pansement et drain temporaire sont possibles. Les cicatrices restent permanentes, même près des oreilles ou des cheveux ; visibilité, élargissement et modifications capillaires varient. Discutez l'équilibre entre accès, correction et position des cicatrices.

Ce n'est pas un lifting facial complet

Une chirurgie du bas du visage peut être associée, mais son étendue, ses incisions, ses risques et ses suites doivent être convenus séparément. Les dessins montrent des accès possibles, pas toutes les techniques.

04 · Après l'intervention

Récupération et résultats

Vos consignes écrites priment sur les délais généraux. Œdème et ecchymoses peuvent masquer les premiers changements ; le suivi fait partie du traitement.

Premiers soins

Suivez les consignes pour plaies, pansements, médicaments prescrits et drain éventuel. Ne retirez pas vous-même les drains et n'ajoutez aucun produit sans accord. Un bandage doux peut être prescrit : ne le resserrez pas et n'improvisez pas de compression cervicale. Demandez comment seront vérifiées circulation et cicatrisation.

Position et activités

Gardez la tête surélevée et droite selon vos consignes, sans torsion, flexion excessive ni pression sur les tissus. N'appliquez pas de glace sur le cou : elle peut compromettre la circulation cutanée. Demandez avant tout autre traitement par froid ou chaleur. Choisissez des vêtements ne tirant pas sur la zone opérée.

Reprendre à votre rythme

Obtenez une autorisation individuelle pour conduite, travail, bain, sport et port de charges. Conduire exige mobilité sûre et vigilance, pas seulement absence de douleur ; ne conduisez pas sous l'effet sédatif d'un médicament. Mobilisation douce et prévention des thromboses suivent votre plan, sans alitement prolongé décidé seul.

Des résultats progressifs

Ecchymoses, œdème, tension et sensibilité modifiée peuvent apparaître au début. Le contour se précise sur des semaines à des mois ; les cicatrices mûrissent plus longtemps. Protégez la peau du soleil selon les consignes. Le vieillissement continue ; bandes, relâchement ou asymétrie résiduels se discutent sans imposer automatiquement une reprise.

Ne pas attendre le prochain rendez-vous

Gonflement rapide du cou, forte tension ou douleur intense d'un côté peuvent signaler un saignement et nécessitent une évaluation urgente. Difficulté à respirer ou avaler, douleur thoracique ou essoufflement : urgence immédiate. Un hématome cervical expansif peut comprimer les voies respiratoires.

05 · Un choix éclairé

Risques et sécurité

Cette chirurgie concerne l'apparence et des structures voisines importantes. Discutez bénéfices, limites, alternatives et risques personnels avant de donner votre consentement éclairé.

Saignement, infection et risques généraux

Un saignement peut former un hématome sous la peau et nécessiter une intervention urgente. Infection et collections liquidiennes peuvent demander médicaments, drainage ou nouvelle opération. Réactions anesthésiques et caillots, notamment vers les poumons, sont des complications possibles importantes, même peu fréquentes.

Peau, plaies et cicatrices

Mauvaise cicatrisation, ouverture de plaie, perte cutanée et cicatrices défavorables sont possibles. La peau peut devenir irrégulière ou changer de couleur ; l'œdème peut persister. La perte de cheveux près des incisions peut être temporaire ou permanente. Nicotine et maladies influencent vascularisation et cicatrisation : discutez vos risques personnels.

Nerfs et mouvements

Engourdissement et troubles sensitifs peuvent s'améliorer ou persister. Une lésion d'une branche du nerf facial peut affaiblir la lèvre inférieure et provoquer sourire ou mouvements asymétriques ; la faiblesse peut être temporaire ou permanente. Douleur persistante et tension gênante nécessitent aussi un avis. Signalez toute faiblesse nouvelle sans l'attribuer simplement à l'œdème.

Aspect et soins supplémentaires

Peau encore lâche ou à nouveau relâchée, bandes visibles, irrégularités et différences entre côtés sont possibles. Des fils peuvent ressortir ou irriter la peau. Insatisfaction ou complications peuvent mener à d'autres traitements ou à une reprise, avec nouvelle récupération et frais éventuels.

Personnaliser le consentement

Cette liste n'est pas exhaustive. Demandez quels risques concernent votre anatomie, votre santé et votre technique, comment les réduire et où seront traitées les urgences. Le consentement témoigne de votre compréhension, sans garantir sécurité ou résultat.

Autres motifs d'appel rapide

Fièvre, rougeur qui s'étend, douleur croissante, écoulement ou ouverture de plaie nécessitent un contact rapide avec l'équipe. Si les symptômes sont sévères ou respiratoires, demandez des soins d'urgence plutôt que d'attendre une réponse à un message.

06 · Bien planifier

Coût et choix du chirurgien

Choisissez un chirurgien plasticien qualifié et expérimenté et une structure chirurgicale autorisée adaptée. Anesthésie, suivi et gestion des urgences comptent davantage qu'une appellation commerciale.

Demander un devis écrit

Obtenez une ventilation personnalisée : chirurgien, anesthésie, établissement, examens, médicaments prescrits, pansements et suivi. Vérifiez si vêtement, nuit de surveillance ou geste associé sont inclus. L'étendue du travail cervical et toute chirurgie faciale distincte doivent être nommées clairement, sans forfait ambigu.

Prévoir les imprévus

Demandez les modalités de facturation des consultations imprévues, urgences, complications et reprises. Qui vous soigne si le chirurgien est absent ? Ce guide ne promet ni tarif, ni financement, ni couverture d'assurance ; obtenez toute décision pertinente directement auprès de votre assureur.

Questions pour comparer les soins


- Quelle formation et quelle expérience avez-vous en chirurgie du cou ? Comment évaluez-vous séparément graisse, bandes musculaires et peau ?
- Pourquoi ce tracé ? Que laisserait non traité une option moins étendue ?
- Une chirurgie du visage est-elle proposée aussi ? Quels risques et contraintes supplémentaires implique-t-elle ?
- Qui assure l'anesthésie, où opère-t-on et quelles dispositions existent pour une urgence ?
- Qui vérifie plaies et drains, et comment joindre un soignant hors des heures habituelles ?

Prendre le temps de choisir

Demandez des exemples pertinents en sachant que votre résultat peut différer. Faites expliquer cicatrices, asymétrie et limites dans un langage simple. Apportez vos questions et, si utile, venez accompagné. Vous pouvez différer, demander un autre avis ou ne pas vous faire opérer. Une petite cicatrice ou un prix inférieur ne doit pas primer sur une opération adaptée et un suivi fiable.

Prendre rendez-vous

Parlons de vos objectifs



Dr Imad Shehadi

Plastic Surgery Institute

Adresse
63 rue Souraty, immeuble Hamra Nassif, 1er étage, Beyrouth, Liban

Téléphone
+9611746345

WhatsApp
+9613307854

Courriel
psi@psi-lb.com

Ce guide est uniquement éducatif : il ne fournit ni avis médical individualisé ni plan de traitement. Il ne garantit aucun résultat et ne remplace pas une consultation approfondie en personne avec un chirurgien plasticien qualifié et expérimenté. Suivez les consignes de votre équipe soignante.

Pour en savoir plus · informations officielles
Intervention · Récupération · Guide hospitalier